二

外臺秘要方卷第二 傷寒下二十一門

朝散大夫守光禄卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

傷寒中風方九首

傷寒結胷方七首

傷寒嘔噦方一十四首

傷寒喉咽痛方八首

傷寒吐唾血及下血方三首

傷寒衂血方四首

傷寒煩渴方九首

傷寒癖實及宿食不消方二首

傷寒春冬欬嗽方三首

傷寒攻目生瘡兼赤白瞖方六首

傷寒口瘡方二首

傷寒手足欲脫疼痛方八首
傷寒虛羸方四首
傷寒不得眠方四首
傷寒小便不利方九首
傷寒下痢及膿血黃赤方一十六首
傷寒䘌瘡方一十首
傷寒陰陽易方八首
傷寒勞復食復方二十五首
傷寒百合病方七首
傷寒狐惑病方四首

傷寒中風方九首 臣億等按傷寒論傷寒中風自是兩疾今云傷寒中風非

病源中風傷寒之狀太陽中風陽浮陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔此其候也

太陽中風以火刼發其汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼其身即發黃陽盛則欲衄（女六反）陰虛小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則誠語（荒語也本作譫）甚者至噦手足躁擾循衣摸牀小便利者其人可療

陽明中風口苦而咽乾腹滿微喘發熱惡寒脉浮緊若下之則腹滿小便難

陽明病若能食爲中風不能食爲中寒

少陽中風兩耳無所聞目赤胷中滿而煩者不可吐下吐下之則悸（其季反）而驚

太陰中風四肢煩疼其脉陽微陰濇而長者爲欲愈

少陰中風其脉陽微陰浮者爲欲愈

厥陰中風其脉微浮者爲欲愈不浮爲未愈仲景傷寒論同並出第七卷中

仲景傷寒論桂枝湯療太陽中風陽浮陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔方

桂心　芍藥　生薑各三兩　甘草二兩炙

大棗十二枚擘

右五物切薑擘棗次切餘藥以水七升煑棗令爛去滓乃內諸藥水少者益之煑令微微沸得三升去滓服一升日三小兒以意減之初一服便得汗出者後服小小闊其間如不得汗者小小促之令其藥勢相及汗出自護如服六物青散法若病重者宜夜服特須避風若服一劑晬時不解病證不變者當更服之至有不肯汗出服二三劑乃愈服此藥食頃亦當飲熱粥以助藥力若初得病甚便以火發汗火氣太過汗出不解煩躁不得寐因此湯加龍骨牡蠣各三兩減桂心生薑各一兩不用芍藥若虛勞裏急腹中痛者取前桂枝湯二

升加膠飴（音夷餳也）一升適寒溫分再服若得大汗出者只用桂枝二兩發汗後重發汗亡陽譫語其脉反和者不死發汗已解半日所重發煩其脉浮數可復發汗宜桂枝湯方在上出第二卷中千金胡洽集驗文仲備急范汪同忌海藻生葱菘菜等物

又療傷寒頭疼腰痛身體骨節疼發熱惡風汗不出而喘麻黃湯方

麻黃（三兩去節） 桂心（二兩） 甘草（炙一兩） 杏人（七十枚去皮兩人尖碎）

右四味切以水九升煑麻黃減二升去上沫内諸藥煑取二升半去滓服八合覆取微汗不須歠粥餘如桂枝法將息忌海藻菘菜生葱（臣億等按張仲景傷寒論麻黃湯惟主傷寒不主中風若中風但可服前桂枝湯）

又療太陽病項背強几几反汗不出惡風者屬葛根湯方

葛根（四兩） 麻黃（四兩去節） 甘草（二兩炙） 芍藥

桂心各二兩 生薑三兩 大棗十二枚擘

右七味切以水一斗煑麻黃葛根減二升去上沫内諸藥煑取三升去滓温服一升覆取微似汗出不須喫熱粥助藥發汗餘將息依桂枝法忌海藻菘菜生葱並出第三卷中張仲景傷寒論

治中風汗出用桂枝此證云汗不出亦傷寒之病非中風也

小品萎蕤湯療冬温及春月中風傷寒則發熱頭眩痛喉咽乾舌強胷内疼心胷痞音披結病也滿腰背強方

萎蕤二兩 石膏三分末綿裹 白薇二兩 麻黃二兩去節

獨活二兩 杏人二兩去皮尖兩人 芎藭二兩 甘草二兩炙

青木香二兩無可用麝香一分代之

右九味切以水八升煑取三升分三服取汗若一寒一熱者加朴消一分及大黃三兩下之忌海藻菘菜並出第六卷中

古今錄驗同一方有葛根二兩

千金療傷寒中風五六日已上但胷中煩乾嘔栝樓實湯方

栝樓實一兩 柴胡半斤 黃芩三兩 甘草三兩炙

生薑四兩切 大棗十枚擘破

右六味切之勿令大碎吹去末以水一斗二升煑得六升絞去滓更煎取三升適寒溫服一升日三服忌海藻菘菜出第十卷中

千金翼療中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水飲水而吐此爲水逆五苓散主之方論去豬苓散也

豬苓三分 澤瀉五分 茯苓三分 桂心二分

白朮三分

右五味擣篩水服方寸匕日三多飲煖水汗出愈忌桃李醋物生葱雀肉等

又傷寒中風醫反下之其人下利日數十行水穀不化腹中雷

鳴心下痞音被堅而滿乾嘔心煩不能得安醫見心下痞以爲病不盡復重下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使之堅甘草瀉心湯主之方

甘草四兩炙　黃芩三兩　大棗十二枚擘　黃連一兩

乾薑三兩　半夏半升洗去滑

右六味切以水一斗煑取六升分六服忌海藻菘菜豬羊

肉餳並出第九卷中一方有人參三兩

古今錄驗療中風傷寒脉浮發熱往來汗出惡風項頸強鼻鳴

乾嘔陽旦湯主之方

大棗十二枚擘　桂心三兩　芍藥三兩　生薑三兩

甘草二兩炙　黃芩二兩

右六物㕮咀以泉水六升煑取四升分四服日三自汗者去

桂心加附子一枚炮渴者去桂加栝樓三兩利者去芍藥桂

加乾薑三累附子一枚炮心下悸者去芍藥加茯苓四兩虛

勞裏急者正陽旦主之煎得二升內膠飴半升分爲再服若

脉浮緊發熱者不可與也忌海藻菘菜生葱等物千金同

又大青龍湯療太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛汗不出而

煩躁方

麻黃六兩去節 桂心二兩 甘草二兩炙 石膏如雞子大碎綿裹

生薑三兩 杏人四十枚去兩人及尖皮 大棗十枚擘

右七味切以水九升先煑麻黃減二升去沫乃內諸藥煑取

三升去滓分服一升厚覆取微汗汗出多者温粉粉之一服

汗者不可再服若復服汗多亡陽逆虛惡風煩燥不得眠也

忌海藻菘菜生葱等物並出第二卷中張仲景傷寒論云中風見傷寒脉者可服之

傷寒結胷方七首一十二法

病源結胷者謂熱毒氣結聚於心胷也此由病發於陽而早下

之熱氣乘虛而痞音被結也結不散也按之痛其脉寸口浮關上反自沉是也脉大不可下下之則死脉浮而大下之爲逆若陽脉浮關上細小沉緊而飲食如故時小便利者名爲藏結藏結病舌上白胎滑者爲難療不往來寒熱其人反靜舌上不胎者不可攻之出第七卷中

張仲景傷寒論問曰病有結胷有藏結其狀如何荅曰按之痛寸脉浮關脉沉名結胷也問曰何謂藏結荅曰如結胷狀飲食如故時時下利寸口脉浮關上小細而沉緊名藏結舌上白胎滑者爲難治藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也病發於陽而反下之熱入因作結胷病發於陰而反下之一作汗之因作痞也所以成結胷者以下之太早故也

結胷證悉具煩躁者亦死

結胷證其脉浮大者不可下也下之則死

夫結胷病項亦強如柔痓（音熾惡也）狀下之則和宜大陷胷丸方

蜀大黃（半斤） 葶藶子（半升熬） 杏人（半升去皮尖熬令赤黑色）

芒消（半升）

右四味擣篩二味杏人合芒消研如泥和散合和丸如彈子大每服一丸用甘遂末一錢匕白蜜一兩水二升同煮取一升溫頓服之一宿乃自下如不下更服取下為效千金翼同

又太陽病脉浮動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛（一云頭痛即眩）胃中空虛客熱動膈短氣煩躁心內懊（於告反）憹（音農）陽氣內陷心下因堅則為結胷大陷胷湯主之若不結胷但頭汗出餘處無汗劑頸而還小便不利身必發黃

大陷胷湯方

蜀大黃（六兩破） 甘遂末（一錢匕） 芒消（一升）

右三味以水六𫝂先煮大黄取二𫝂去滓内芒消煮一兩沸

内甘遂末温服一𫝂得快利止後服千金翼同

又傷寒六七日結胷熱實脉沉緊心下痛按之石堅大陷胷湯

主之方依前法

又傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯

但結胷無大熱者此水結在胷脅也但頭微汗出者大陷胷湯

主之方依前法

大柴胡湯方

柴胡半斤 枳實四枚炙 生薑五兩 黄芩三兩

芍藥三兩 半夏半升洗 大棗十二枚擘

右七味切以水一斗二𫝂煮取六𫝂去滓更煎取三𫝂温服

一𫝂日三服一方加大黄二兩若不加大黄恐不名爲大柴

胡湯忌羊肉餳千金翼古今録驗同

又太陽病二三日不能卧但欲起心下必結脉微弱者本有久寒也而反下之若利止者必作結胸未止者四日復下之此作協熱利也

又太陽病下之其脉促不結胸者此爲欲解也若心下滿鞕痛者此爲結胸也大陷胸湯主之但滿而不痛者此爲痞柴胡不中與之也宜半夏瀉心湯主之方

半夏半升洗 乾薑三兩 人參三兩 甘草三兩炙

黃連一兩 大棗十二枚擘 黃芩三兩

右七味切以水一斗煮取六升去滓溫服一升日三若須大陷胸湯服者如前法忌羊肉餳海藻菘菜豬肉冷水等千金翼同 一方半夏五兩

又小結胸病正在心下按之則痛脉浮滑者小陷胸湯主之方

黃連一兩上好者 栝樓實一枚大者破 半夏半升洗

右三味切以水六升煑栝樓實取三升去滓內諸藥煑取二升去滓温分三服忌羊肉餳豬肉千金翼同

又病在太陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱却不得去彌更益煩皮上粟起意欲飲水而反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散用前篇方

又寒實結胷無熱證者與三物小陷胷湯方如前法白散亦可服

文蛤散方

文蛤五兩

右一味擣篩爲散以沸湯和一方寸匕服之湯用五合千金翼同

又白散方

桔梗三分 貝母三分 巴豆一分去心及皮熬令黑赤別研如脂

右三味擣篩更於臼內擣之以白飲和服強人半錢匕羸人

減之病在膈上則吐在膈下則利利不止飲冷粥一杯止並出第四卷中千金翼同忌豬肉蘆笋等

傷寒嘔噦方一十四首

病源傷寒病後胃氣不和此由初受病時毒熱氣盛多服冷藥瀉下及飲冷水病折以後熱勢既退冷氣乃動故使心下堅牢噫噦食臭腹内雷鳴而泄利此由脾胃氣虚冷故也出第八卷中

仲景傷寒論療嘔噦心下悸痞鞕不能食小半夏湯方

半夏一升洗　生薑八兩去皮

右二味切以水七升煮取一升半去滓分再服忌羊肉餳

又療嘔噦心下痞鞕者以膈間有水頭眩悸半夏加茯苓湯方

半夏一升洗　生薑八兩去皮　茯苓三兩

右三味切以水七升煮取一升半去滓溫分再服忌羊肉餳酢等物

又療胷內似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心中憒憒然無賴者生薑汁半夏湯兼主天行方

生薑汁一升 半夏半升洗切

右二味以水三升煎半夏取一升內薑汁取一升半緜漉小冷分二服一日一夜服令盡嘔噦一服得止者停後服忌羊肉餳救急同

又療乾嘔噦若手足厥冷者小橘皮湯兼主天行方

橘皮四兩 生薑八兩去皮

右二味狹長切以水七升煑取三升去滓小冷服一升下咽則愈救急同出第十六卷中

深師療傷寒病啘不止甘草湯方兼主天行

甘草三兩炙 橘皮三兩

右二味切以水五升煑取一升去滓頓服之日三四服取差

忌海藻菘菜崔氏同

又半夏散方

半夏洗焙乾

右一味末之生薑湯和服一錢匕忌羊肉餳等

又赤蘇湯方

赤蘇一把

右一味水三升煮取一升去滓稍稍飲之肘後同

又乾薑丸方

乾薑六分 附子四分炮

右二味擣篩以苦酒丸如梧子服三丸日三服酒飲下皆得

忌豬肉肘後同

又療傷寒噦甘竹茹湯方

甘竹茹四兩 生白米一升

右二味以水八升煑之取米熟湯成去滓分服徐徐服療
風熱氣噦甚神驗諸噦亦佳
又療傷寒嘔噦胷滿虛煩不安大橘皮湯方
橘皮一兩 甘草一兩炙 生薑四兩 人參二兩
右四味切以水六升煑取二升去滓分三服忌海藻菘菜並
出第十四卷中
小品茅根橘皮湯療春夏天行傷寒胃冷變啘方
白茅根一升切 橘皮三兩 桂心二兩切
右三味切以水六升煑取三升去滓溫分三服數數服之盡
復合之啘止乃停取微汗有熱減桂心一兩忌生葱文仲同
出第六卷中 一方有葛根二兩
千金療傷寒後嘔噦及乾嘔不下食生蘆根飲方
生蘆根一升切 青竹茹一升 粳米三合 生薑二兩切

右四味以水七升先煑千里鞋底一隻取五升澄清下藥煑取二升半去滓隨意便飲不差重作

又療傷寒後嘔噦通草湯方

通草兩三 生蘆根切一升 橘皮一兩 粳米三合

右四味切以水五升煑取二升去滓隨意便稍飲不差更作取差止古今録驗文仲同出第十卷中

千金翼乾嘔吐涎沫而頭痛茱萸湯主之方

吴茱萸一升炒 大棗十二枚擘 生薑六兩切 人參三兩細剉

右四味以水五升煑取二升去滓分服七合日三仲景同出第十卷中此張仲景傷寒論方

傷寒咽喉痛方八首

病源傷寒病過經而不愈脉反沈遲手足厥逆者此爲下部脉不至陰陽隔絶邪客於足少陰之經毒氣上熏故喉咽不利或

痛而生瘡出第七卷中

仲景傷寒論少陰病咽喉痛者半夏散及湯主之方

半夏洗　甘草炙　桂心

右三味等分各擣篩畢更合擣之以白飲服方寸匕日三服若不能服散者水一升煮七沸內散兩匕更煮三沸下火令小冷少少含細嚥之半夏有毒不當散服之忌羊肉生葱海藻菘菜餳千金翼同出第六卷中

文仲療傷寒毒攻喉咽腫痛方兼主天行

切商陸炙令熱以布藉喉以熨布上冷復易之肘後同

又方

眞藺茹爪甲大內口中以牙小嚼汁以漬喉當微覺異爲佳亦主天行肘後同

又附子丸方

附子炮　藜蘆等分

右二味末之蜜和丸服如梧子一枚飲下含黃蘗亦佳並出第二卷中忌豬肉狸肉

深師貼喉膏療傷寒舌強喉痛方

蜜一升　甘草四兩切　豬膏半斤

右三味微火煎甘草豬膏令數沸去滓乃內蜜溫令銷相得如棗大含化稍稍咽之忌海藻菘菜出第十四卷中

集驗療傷寒熱病喉中痛閉塞不通烏扇膏方

生烏扇一斤切　豬脂一斤

右二味合煎烏扇藥成去滓取如半雞子薄綿裹之內口中稍稍咽之取差張文仲千金等同忌酒蒜等物

又升麻湯方

升麻三兩　通草四兩　射干二兩　羚羊角三兩屑

芍藥三兩　生蘆根切一升

右六味切以水七升煮取二升半去滓分爲三服徐徐服千金古今録驗同並出第三卷中

千金治傷寒熱病後口乾多唾咽痛乾棗丸方

乾棗二十枚　烏梅十枚

右二味擣合蜜和丸如杏核大綿裹含化嚥津自愈出第十卷中

傷寒吐唾血及下血方三首

病源此由諸陽受邪熱初在表應發汗而汗不發致使熱毒入深結於五藏内有瘀積故吐血出第八卷中

仲景傷寒論吐血不止者柏葉湯主之方

青柏葉三兩　乾薑三兩切　艾三把

右三味以水五升煮取一升去滓別絞取新出馬通汁一升

相和合煎取一升綿濾之温分再服馬通是馬屎汁也（一方有阿膠無艾）

又吐血下血黃土湯主之方

釜竈下黃焦土（半升綿裹） 甘草（三兩炙） 乾地黃（三兩）

白朮（三兩） 附子（三兩炮破） 阿膠（三兩炙末） 黃芩（三兩）

右七味切以水八升煑六味取二升去滓內膠令烊（余章切下並同）分三服忌海藻菘菜蕪荑豬肉桃李雀肉等物並出第十六卷中

古今錄驗蒲黃湯療傷寒溫病天行疫毒及酒客熱傷中吐血不止面黃乾嘔心煩方

蒲黃 桑寄生 桔梗（一作栝樓） 犀角（屑）

甘草（各二兩炙） 葛根（三兩）

右六味切以水七升煑取三升去滓分三服徐徐服之忌海藻菘菜豬肉出第三卷中

傷寒衄血方四首

病源傷寒病衄血者此由五藏熱結所為也心主於血肝藏於血熱邪傷於心肝故衄血也衄者鼻出血也肺主於氣而開竅於鼻血隨氣行所以從鼻出陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄衄家不可攻其表汗出額上沮急而緊直視而不能眴不得眠亡血不可攻其表汗出則寒慄而振脉浮緊發熱其身無汗自衄者愈出第八卷中

肘後療傷寒大病差後小勞便鼻衄牡蠣散及丸方

左顧牡蠣十分熬　石膏五分

右二味擣末酒服方寸匕日三四亦可蜜丸如梧子大酒服十五丸集驗千金並同出第二卷中

小品芍藥地黃湯療傷寒及溫病應發汗而不發之內瘀有畜血者及鼻衄女六反吐血不盡內餘瘀血面黃大便黑者此主消化

瘀（於據反）血方

芍藥（三兩） 生地黃（半斤） 牡丹（二兩） 犀角（一兩屑）

右四味切以水九升煑取三升分三服其人喜忘如狂者加地黃三兩黃芩三兩其人脉大來遲腹不滿自言滿者爲無熱但依方服不須黃芩也忌蕪荑胡荽（一方不加地黃）

崔氏療傷寒衄鼻熱毒去血若去數升者勿療自住若爲去血不住者外以飛雪湯洗内以苦參湯療之飛雪洗之湯方兼療天行

麻黃（三兩去節） 石膏（三兩碎） 芫花（一兩熬） 大黃（二兩）

右四味切以水一斗半煑取七升去滓沈冷披髪仰卧因以湯淋其額趣令血住止勿向下卧及坐也湯中有芫花壞人眼勿近之

又療衄鼻苦參湯方

苦參三分　黃連二兩　梔子二七枚擘　大黃一兩

地黃一兩生乾者

右五味切以水五升煑取一升半去滓分再服吾其年已療數十人無不差者都下地黃難得遇無使便闕亦差忌蕪荑豬肉冷水並出第一卷中一方更用石榴花半兩

傷寒煩渴方九首

病源傷寒渴者由熱氣入於藏流於少陰之經少陰主腎腎惡燥故渴而引飲又經發汗吐下已後腑藏空虛津液竭絕腎家有餘熱故渴也出第七第八卷中

仲景傷寒論療服桂枝湯大汗後煩渴熱不解脉洪大者屬白虎加人參湯方

知母六兩　甘草二兩炙　石膏一升碎綿裹　人參二兩

粳米一升玉函經用糯米

右五味切以水一斗二升煑米熟去米内諸藥煑取六升去
滓温服一升日三忌海藻菘菜出第十卷中小品同
又若脉浮發熱渴欲飲水小便不利者豬苓湯主之方
豬苓一兩去皮 茯苓一兩 阿膠一兩炙 滑石一兩碎綿裹
澤瀉一兩
右五味以水四升先煑四物取二升去滓内阿膠令烊銷温
服七合日三服忌醋物千金翼同出第五卷中
范汪栝樓湯主渴飲方
栝樓根內黄脉少者三兩
右一味切以水五升煑取一升分二服先以青淡竹瀝一升
合水二升煑好銀二兩減半去銀先與病人飲之訖須臾後
乃服栝樓湯其銀汁須冷服出第二十卷中
千金療傷寒後結熱在内煩渴青葙子丸方

青葙子五兩　龍膽三兩　黃芩一兩　梔子人一兩

苦參一兩　黃蘗二兩　栝樓一兩　黃連二兩

右八味擣篩爲末蜜丸先食服如梧子七丸飲下日三不知稍增忌豬肉冷水集驗同出第九卷中

深師黃芩人參湯療傷寒吐下後內外有熱煩渴不安方

黃芩　人參　甘草　桂心

生薑各二兩　大棗十五枚擘破

右六味切以水八升煑取三升分三服徐徐服忌菘菜海藻生葱等物

又療傷寒除熱止渴欲飲水栝樓根湯方

黃芩三兩　人參二兩　桂心二兩　大黃二兩

栝樓根三兩　芒消二兩　甘草二兩炙

右七味切以水八升煑取三升去滓飲一升須臾當下不下

復飲一升得下止勿復飲湯藥力勢歇乃可食糜耳一方用
生薑二兩忌海藻菘菜生葱油膩等物

又療傷寒下後除熱止渴五味麥門冬湯方

麥門冬去心　五味子　人參　甘草炙
石膏碎各一兩

右五味擣篩三指撮水一升二合煑令沸得四合盡服忌海
藻菘菜並出第十四卷中

古今録驗黃龍湯療傷寒十餘日不解往來寒熱狀如溫瘧渴
胷滿心腹痛方

半夏半升洗　生薑三兩　人參三兩　柴胡半斤
黃芩三兩　甘草三兩炙　大棗十二枚擘

右七味切以水一斗二升煑取六升去滓更煎取三升溫服
一升日三服不嘔而渴去半夏加栝樓根四兩服如前忌羊

肉餳海藻菘菜等物出第三卷中此本張仲景傷寒論方

又高堂丸療傷寒苦渴煩滿欲死令極飲水法方

大黃二分　消石三分熬　釜底墨一分　竈突中墨一分

黃芩一分　梁上塵一分　竈中黃土一分　麻黃二分去節

胡洽用芒消無黃土

右八味篩末蜜和如彈丸大取一丸著一盞水中盡用服之則自極飲水汗出得熱除矣一名黑奴丸一名駐車丸并療溫瘧神良並出第二卷中此方第一卷用小麥黑奴名黑奴丸

傷寒癖實及宿食不消方二首

病源此謂被下後六七日不大便煩熱不解腹滿而痛此爲胃中有乾糞挾宿食故也或先患寒癖因有宿食又感於傷寒熱氣相搏故宿食不消也出第八卷中

深師駃豉丸療傷寒留飲宿食不消一名續命丸方

黃芩五兩 大黃五兩 梔子人十六枚大 黃連五兩去毛
豉一升熬 甘遂三兩太山者 麻黃五兩去節 芒消二兩
巴豆一百枚去皮及心熬研

右九味擣篩白蜜和丸如梧子服三丸以吐下爲度若不吐利加二丸一本有杏人七十枚范汪同忌豬肉冷水蘆笋等出第十四卷中

古今錄驗續命丸療傷寒及澼實痰癊百病方

大黃五兩 黃連一兩 麻黃五兩去節 甘遂三兩熬
黃芩二兩 芒消二兩研 杏人七十枚去皮尖熬 巴豆一百枚去心熬研
豉一升熬

右九味擣篩蜜和丸得傷寒一日服一丸如小梧子大二日二丸至六七日六七丸但吐下得汗愈若水澼及痰實服三五丸日二范汪延年刪繁同忌豬肉冷水蘆笋出第三卷中

傷寒春冬欬嗽方三首

病源此由邪熱客於肺也上焦有熱其人必飲水水停心下則肺爲之浮肺主於欬水氣乘之故欬嗽出第八卷中

小品射干湯主春冬傷寒秋夏中冷欬嗽曲拘不得氣息喉鳴啞失聲乾嗽無唾喉中如哽者方

射干二兩　半夏五兩洗　杏人二兩去皮尖兩人　乾薑二兩炮

甘草二兩炙　紫菀二兩　肉桂二兩　吳茱萸二兩

當歸二兩　橘皮二兩　麻黃二兩去節　獨活二兩

右十二味切以水一斗煮取三升去滓溫分三服始病一二日者可服此湯汗後重服勿汗也病久者初服可用大黃二兩初秋夏月暴雨冷及天行暴寒熱喜伏於內宜生薑四兩代乾薑除茱萸用枳實二兩炙忌羊肉海藻菘菜餳生葱出第六卷中

古今録驗下氣橘皮湯療春冬傷寒秋夏冷濕欬嗽喉中鳴聲上氣不得下頭痛方

橘皮　紫菀　麻黃去節　杏人去雙人尖皮

當歸　桂枝　甘草炙　黃芩各三分

右八味切以水七升煑取三升分三服不差重合之忌海藻菘菜生葱出第三卷中

延年療傷寒骨節疼頭痛眼睛疼欬嗽知母湯方

知母二兩　貝母三兩　乾葛三兩　芍藥三兩

石膏四兩碎裹　黃芩三兩　杏人一兩去皮尖及雙人　梔子人三兩擘

右八味切以水七升煑取二升五合去滓分為三服如人行八九里再服忌蒜麪七日出第九卷中

傷寒攻目生瘡兼赤白翳方六首

病源目者藏腑之精華肝之外候也傷寒熱毒壅滯熏蒸於肝

上攻於目則令目赤腫痛若毒氣盛者眼生瞖膜又肝開竅放
目肝氣虛熱乗虛上衝於目故目赤痛重者生瘡瞖白膜息肉
出第八卷中

肘後療傷寒大病後熱毒攻目方

煑蜂房以洗之日六七度張文仲同

又方

冷水漬青布以掩目張文仲同

又療熱病後生瞖方

燒豉二七粒末内管中以吹之文仲備急同並出第
二卷中

小品漏蘆連翹湯療傷寒熱毒變作赤色癰疽丹瘮腫毒及
眼赤痛生彰瞖悉主之方兼療天行

漏蘆二兩 連翹二兩 黃芩二兩 麻黃二兩去節

白斂二兩　升麻二兩　甘草二兩炙　大黃三兩切

枳實三兩炙

右九味切以水九升煮取三升去滓溫分三服相去二食頃更服熱盛者可加芒消二兩忌海藻菘菜等物千金同

又秦皮湯療毒病衝眼忽生赤翳或白或膚起或赤痛不得視光痛入心肝或眼外浮腫如吹汁出生膜覆珠子方

秦皮二兩　前胡二兩　常山二兩　黃芩二兩

升麻二兩　芍藥二兩　白薇二兩　枳實二兩炙

大黃三兩　甘草二兩炙

右十味以水八升煮取三升分三服相去二食頃更服若盛熱者可加芒消二兩忌海藻菘菜生葱生菜出第六卷中一方加蕤人一兩梔子人半兩

張文仲秦皮湯主傷寒病熱毒氣入眼生赤脉赤膜白膚白翳

者及赤痛不得見光痛毒煩惱者神効方

秦皮　升麻　黃連各一兩

右三味切以水洗去塵用水四升煑取二升半冷之分用三合仰眼以綿繞筋頭取湯以滴眼中如屋漏狀盡三合止須臾復用日五六遍乃佳忌豬肉冷水出第二卷中

傷寒口瘡方二首

病源夫傷寒冬時發其汗必吐利口中爛生瘡以其熱毒在藏心脾煩壅表裏俱熱熱不已毒氣熏於上膲故令口舌乾燥生瘡也出第七卷中

深師療傷寒熱病口瘡黃蘗蜜方

黃蘗削去上皮取裏好處薄斜削

右一味以崖蜜半斤極消者以漬蘗一宿唯欲令濃含其汁良久吐之更復如前若胷中熱有瘡時飲三五合尤良

又療傷寒口瘡爛者升麻湯方

升麻一兩 甘草一兩炙 竹葉五合切 麥門冬三分去心

牡丹一分 乾棗二十枚擘

右六味切以水四升煮取一升半去滓分五服含稍稍咽之爲度忌海藻菘菜胡荽等並出第十四卷中

傷寒手足欲脫疼痛方七首

病源此由熱毒氣從內而出循經絡攻於手足也人五藏六腑井滎俞皆出於手足指故毒從藏腑而出也出第八卷中

范汪療傷寒熱病手足腫欲脫方

生牛肉裹之腫消痛止深師同出第三十卷中

崔氏療傷寒手足熱疼欲脫方

取羊屎煮汁以淋之差止亦療時疾陰囊及莖腫亦可煮黃蘗洗之肘後深師集驗千金備急並同出第

一卷中

集驗療毒熱攻手足腫疼欲脫方

濃煮虎杖根適寒溫以漬手足入至踝上一尺范汪肘後千金同兼療天行

又方

酒煮苦參以漬之范汪千金集驗同並出第二卷

千金療毒熱病攻手足腫疼痛欲脫方

煮馬糞若羊糞汁漬之豬膏和羊糞塗之亦佳范汪集驗肘後同

又方

取常思草絞取汁以漬之一名蒼耳范汪集驗肘後同出第十卷中

備急療熱病手足腫欲脫者方兼主天行

以稻穰灰汁漬之佳集驗千金肘後同出第一卷中

傷寒虛羸方四首

病源其人血氣先虛復為虛邪所中發汗吐下之後經絡俱損傷陰陽竭絕熱邪始散眞氣尚少五藏猶虛穀神未復無津液以榮養故虛羸而生病焉出第八卷中

集驗療傷寒虛羸少氣氣逆若嘔吐方

石膏一升碎綿裹　竹葉一把　麥門冬一升去心　人參二兩

半夏一升洗　生薑四兩　甘草二兩炙

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓內粳米一升米熟去米飲一升日三服忌海藻菘菜羊肉餳出第三卷中

又生地黃湯療傷寒有熱虛羸少氣心下滿胃中有宿食大便不利方

生地黃三斤　大黃四兩　大棗二十枚擘　甘草一兩炙

芒消二合

右五味合擣令相得蒸五升米下熟絞取汁分再服忌海藻菘菜出第二卷中

千金療傷寒虛羸少氣嘔吐竹葉石膏湯方

石膏一升碎綿裹 竹葉二把 麥門冬一升去心 人參二兩

半夏半升洗 甘草二兩

右六味以水一斗煮取六升去滓內粳米一升煮米熟去米飮一升日三服忌海藻菘菜羊肉餳出第十卷中此張仲景傷寒論方

張文仲雞子豉湯療吐下後虛羸欲死方

雞子一十枚 豉四合綿裹

右二味以水五升先煑雞子取二升內豉又煑三四沸去滓分再服支同此出姚方第二卷中集驗備急同各用雞子十四枚

傷寒不得眠方四首

病源夫衛氣晝行於陽夜行於陰陰主夜夜主臥謂陽氣盡陰氣盛則目瞑矣今熱氣未散與諸陽并所以陽獨盛陰偏虛雖復病後仍不得眠者陰氣未復於本故也出第八卷中

仲景傷寒論療傷寒發汗若吐下後虛煩不得安眠劇則反覆顛倒心內苦痛懊憹（上奧下農 又奴凍反）者屬梔子豉湯證方

肥梔子（十四枚擘） 香豉（四合綿裹）

右二物以水四升先煑梔子取二升半去滓內豉更煑取一升半去豉分溫再服得吐止後服

肘後療大病差後虛煩不得眠眼中疼痛懊憹烏梅豉湯方

豉（七合綿裹） 烏梅（十四枚擘）

右二物以水四升煑烏梅取二升半內豉更煑取一升半去滓溫分再服無烏梅用梔子四枚

又半夏茯苓湯方

半夏三兩洗　秫米一升　茯苓四兩

右三味切以千里流水一石揚之萬遍澄取二斗合煑諸藥得五升去滓温分五服忌羊肉餳酢物等並出第一卷中

深師酸棗湯療傷寒及吐下後心煩乏氣晝夜不眠方

酸棗人四升　麥門冬一升去心　甘草二兩炙　蝭母二兩知母也

茯苓二兩　芎藭二兩　乾薑三兩

右七味切以水一斗六升煑酸棗取一斗去棗内藥煑取三升去滓温分三服忌海藻菘菜大醋出第十四卷中

傷寒小便不利方九首

病源傷寒發汗後而汗出不止津液少胃中極乾小腸有伏熱故小便不通也出第八卷中

仲景傷寒論少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此爲有水氣或欬或小便自利或下利

或嘔者眞武湯主之方

茯苓三兩 白芍藥三兩 附子一枚炮去皮破八片 白朮三兩

生薑三兩去皮

右五味切以水八升煮取三升去滓温服七合日三若欬者加五味子半升細辛一兩乾薑一兩若小便自利者去茯苓若下利者去芍藥加乾薑二兩嘔者去附子加生薑足前成半斤忌酢豬肉桃李雀肉等出第六卷中深師同兼主天行大効

又傷寒六七日已發汗而復下之胷脅滿結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此未解也屬小柴胡桂薑湯主之方

柴胡半斤擇去土 桂心三兩 黃芩三兩 牡礪二兩熬

甘草二兩炙 栝樓根四兩 乾薑二兩

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升温服一升日三初一服微煩後汗出便愈忌生葱海藻菘菜出第四卷中

又療傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵蔯湯主之方

茵蔯六兩　肥梔子十四枚擘　大黃二兩去皮酒洗破三片

右三味以水一斗二升先煑茵蔯減二升去滓內二物煑取三升去滓分温三服日三小便當利尿如皂莢沫狀色正赤一宿腹減黃從小便去出第五卷中張文仲千金並同

又服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之方

芍藥　生薑切　白朮　茯苓各三兩

甘草二兩炙　大棗十二箇擘

右六味切以水八升煑取三升去滓温服一升小便利則愈

忌海藻菘菜酢桃李雀肉等

肘後療小腹滿不得小便方兼療天行

細末雄黃蜜和爲丸如棗核内溺孔中令入半寸出第二卷中文仲同

千金翼療少陰病四逆其人或欬或悸其悸反或小便不利或腹中痛或洩利下重四逆散方

甘草十分炙　枳實十分炙　柴胡十分　芍藥十分

右四味擣細篩白飲和服方寸匕日三服欬者加五味子乾薑各五分幷主下利脅中悸者加桂心五分小便不利者加茯苓五分腹中痛者加附子一枚洩利下重者先以水五升煑薤二升取三升以散三方寸匕内湯中煑之取一升半分再服忌海藻菘菜仲景范汪同出第十卷中

崔氏療傷寒熱盛小便不利滑石湯方兼療天行

滑石碎二兩　葶藶子一合熬

右二物以水二升煑取七合去滓頓服之

又方

擣生葱傅臍下橫文中燥易之

又瞿麥湯方

瞿麥三兩 甘草三兩炙 滑石四兩 葵子二合半

石韋三兩去毛令盡

右五味切以水八升煑取二升半分三服忌海藻菘菜並出

第一卷中古今錄驗同

傷寒下痢及膿血黃赤方一十六首

病源傷寒病若表實裏虛熱氣乘虛而入攻於腸胃則下黃赤汁若溫毒氣盛則腹痛壯熱下膿血如魚腦或如爛肉汁若寒毒入胃則腹滿身熱下清穀下清穀者不可攻表汗出必脹滿表裏俱虛故也

傷寒六七日不利便發熱而痢其人汗出不止者死但有陰無

陽故也

下痢有微熱其人渴脉弱者今自愈脉沈弦者下重其脉大者爲未止脉微數者爲欲自止雖發熱不死少陰病八九日而一身手足盡熱熱在膀胱必便血下痢脉反浮數尺中自濇其人必圊膿血少陰病下利若痢自止惡寒而欲蜷手足温者可療

陽明病下痢其人脉浮大此皆爲虛弱強下之故也

傷寒下痢日十餘行其人脉反實者死出第八卷中張仲景傷寒論陽明無下痢證不可下或有云下利其脉浮大者此皆爲虛以強下之故也設脉浮革因爾腸鳴當温之與水即噦

仲景傷寒論傷寒本自寒下醫復吐之下之不解者寒格更遂吐下食入還吐出者屬乾薑黃連人參湯主之方

乾薑　黃連　黃芩　人參各三兩

右四味切以水六升煮取二升去滓分再服之忌豬肉冷水等出第六卷中

又太陽病桂枝證醫反下之痢遂不止脉促(一作縱)者表未解也喘而汗出者屬葛根黃連湯方

葛根(八兩) 黃連(三兩金色者) 黃芩(三兩切) 甘草(二兩)

右四味切以水八升先煑葛根減二升掠去沫内諸藥煑取二升去滓温分再服忌豬肉冷水海藻菘菜出第七卷中

肘後療傷寒若下膿血者赤石脂湯方

赤石脂(二兩碎) 乾薑(二兩切) 附子(一兩炮破)

右三味以水五升煑取三升去滓温分三服後臍下痛者加當歸一兩芍藥二兩用水六升煑忌豬肉范汪張文仲同

又主下痢不能食者兼療天行黃連丸方

黃連(一兩) 烏梅(二十枚炙燥)

右二味擣末臘如博棊子一枚蜜一升於微火煎令可丸如梧子一服十五丸日三忌豬肉冷水出第一卷中

又白通湯療傷寒泄痢不已口渴不得下食虛而煩方

大附子一枚生削去黑皮破八片　乾薑半兩炮　甘草半兩炙

葱白十四莖

右四味切以水三升煑取一升二合去滓温分再服渴微嘔心下停水者一方加犀角半兩大良忌海藻菘菜豬肉范汪同出第十四卷中張仲景傷寒論白通湯惟主少陰下利厥逆無脉乾嘔而煩者白通加豬膽湯主之本無甘草仍不加犀角

范汪療傷寒腹中微痛不止下痢秦皮湯方

秦皮三兩　黃連四兩　白頭翁二兩　阿膠三兩

右四味㕮咀三味以水八升煑得二升絞去滓内膠令烊適寒温先食飲七合日三服忌豬肉冷水

又豉薤湯療傷寒暴下及滯痢腹痛方

豉一升　薤白一把寸切

右二物以水三升煑令薤熟漉去滓分為再服不差復作

又葸草湯療傷寒除熱止下痢方

葸草二兩 黄連四兩 當歸二兩

右三味切以水六升煑得二升適寒温飲五合日三忌猪肉冷水等物

又療傷寒下痢脉微足厥冷通草湯方

通草一兩 乾薑一兩 枳實四兩炙 人參一兩

附子一枚炮令裂破

右五味切以水六升煑取二升適寒温飲五合日三不差稍加至七合忌豬肉並出第三十卷中

小品犀角湯療熱毒下黄赤汁及赤如腐爛血及赤滯如魚腦腹痛壯熱諸藥無效方

黄蘗一兩半 黄芩一兩半 白頭翁一兩 黄連二兩

當歸一兩 牡蠣一兩半熬 犀角屑半兩 艾葉半兩

石榴皮一兩半 桑寄生一兩 甘草一兩炙

右十一味切以水八升煑取三升分三服忌豬肉冷水海藻菘菜出第六卷中古今録驗同

集驗療傷寒後下痢膿血蘗皮湯方

黃蘗二兩 黃連四兩 梔子人十四枚擘 阿膠一兩炙

右四味切以水六升煑三味取二升去滓內膠令烊温分再服忌豬肉冷水范汪同出第二卷中

千金翼熱痢下重白頭翁湯主之方

白頭翁二兩 黃蘗三兩 黃連三兩 秦皮三兩切

右四味切以水七升煑取二升去滓分服一升不愈更服忌豬肉冷水范汪同出第十卷中此張仲景傷寒論方

崔氏療傷寒後赤白滯下無數阮氏桃華湯方

赤石脂八兩冷多白滯者減四兩 粳米一升 乾薑四兩冷多白滯者加四兩切

右三味以水一㪷煑米熟湯成去滓服一升不差復作熱多則帶赤冷多則帶白千金翼方不同加減稍别傷寒論千金范汪同張仲景傷寒論煑湯和赤石脂末一方寸匕服

又療傷寒熱痢黃連丸方

黃連三兩去毛　當歸三兩　乾薑二兩　赤石脂二兩切

右四味擣篩蜜和丸如梧子大服三十丸日三叔尚書以療熱痢是歲傳與東都當方諸軍營及夏口戍人發者數千餘人余時亦復用之亦佳但時用之不及諸湯速耳當服百丸許乃斷忌豬肉冷水並出第一卷中

張文仲陶氏傷寒下痢豉薤湯方

豉一斤綿裹　薤白一握　梔子十四枚擘破

右三味以水五升煑取二升半去滓温分三服小品云此方主温毒及傷寒内虛外熱攻腸胃下黃赤汁及如爛肉汁并

去赤帶下伏氣腹痛諸熱毒悉主之水四升先煑梔子薤白令熟內豉煑取二升分三服千金備急方同

又療傷寒下痢惡血不止犀角湯方

乾薑一兩 犀角一兩末 地榆一兩 蜜二合

右四味切以水五升煑取一升半去滓下蜜更煑至一升分三服自愈此治熱毒蠱利出千金同並出第十五卷中

傷寒䘌瘡方一十首

病源凡得傷寒及天行熱病日數校多腹內有熱又人食少腸胃空虛三蟲行作求食食人五藏及下部也䘌病之候齒齗無色舌上盡白甚者脣裏有瘡四肢沉重忽忽喜眠如此皆爲蟲食其肛肛爛見五藏則死當數看其上脣內有瘡唾血脣內如粟瘡者則心內懊憹痛此蟲在上食其五藏下脣內生瘡者其人不寤此蟲食下部皆能殺人也出第八卷中

肘後若病人齒齗無色舌上白者或喜眠憒憒音膾不知痛痒處或下痢宜急療下部不曉此者但攻其上不以爲意下部生䘌蟲食其肛肛爛見五藏便死也療之方

燒馬蹄作灰細末豬膏和塗綿以導下部日數度差

又桃人苦酒湯方

桃人五十枚去皮尖及兩人 苦酒二升 鹽一合

右三味煑取六合去滓盡服之並出第一卷中

深師療䘌食下部桃皮湯方

桃皮二兩 槐子二兩 艾二兩 大棗三十枚擘一方用黃連

右四味切以水五升煑取三升去滓溫分三服之

又療䘌蟲食下部方

以泥作甖以竹筒如指所横穿甖肚筒一頭内下孔中内如雞子艾燒之人就甖口吹之常令艾燒強人

可益艾甚良千金同

又龍骨湯治傷寒已八九日至十餘日大煩渴熱盛而三焦有瘡䘌者多下或張口吐舌呵吁目爛口鼻生瘡吟語不識人宜服此湯除熱毒止痢神方

龍骨 半斤碎

右一味以水一斗煑取四升沈之井底令冷服五合餘漸漸進之恣意如飲尤宜老少無味殆如飲水赤斷下文仲備急千金等同

又療傷寒及諸病之後內有瘡出下部煩者黃連犀角湯方

黃連 一兩去毛　烏梅 十四枚擘　犀角 三兩屑　青木香 半兩

右四味切以水五升煑取一升半分再服忌猪肉冷水等並出第十四卷中

范汪療傷寒心中懊憹下痢穀道中爛傷當服懊憹散以𧏾藥

內穀道中懊憹散方

藋蘆十分　乾漆二分　萹蓄二分

右三味各異擣篩粉粥飲服一錢匕先食日再服千金同

又療䘌懊憹麝香散方

麝香一分研　雄黃一分研　丹砂一分研　犀角一分屑

羚羊角一分屑　青葙子一分　黃連一分　升麻一分

桃人一分熬　貝齒一分

右十味並擣合下篩先食以小麥粥服錢五匕服藥訖復以錢五匕綿裹以導穀道中食頃去之日三忌豬肉冷水生血物等並出第三十三卷中

小品青葙子散療熱病有䘌下部生瘡方

青葙一兩　藋蘆四兩　狼牙三分　橘皮二分

萹蓄二分切之

右五味擣下篩粥飲和合服兩錢匕日三不知稍增之出第六卷中（千金同有甘草一分）

張文仲療傷寒兼䘌瘡王叔和云其候口脣皆生瘡唾血上脣內有瘡如粟者則心中懊憹痛如此則此蟲在上乃食五藏若下脣內生瘡其人喜眠者此蟲在下食下部方

取雞子一枚扣頭出白與漆一合熟和令調如漆還內殼中仰吞之食頃或半日或下蟲或吐蟲劇者再服乃盡熱除病愈凡得熱病腹內熱食少三蟲行作求食食人五藏及下部人不能知可服此藥不爾䘌蟲殺人集驗深師肘後同

又方

豬膽一具

右一味漬著半升苦酒中和之煎三沸三下三上藥成可放温空腹飲一滿口蟲即死有人經用之驗並出第二卷中千

金同

傷寒陰陽易方八首

病源傷寒陰陽易病者是男子婦人傷寒病新差未平復而與之交接得病者名爲陰陽易也其男子病新差未平復而婦人與之交接得病者名陽易其婦人得病新差未平復而男子與之交接得病者名陰易若二男二女並不相易所以呼爲易者陰陽感動其毒度著於人如換易也其病之狀身體重小腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胷頭重不能舉眼内生䁾四肢拘急小腹疞痛手足拳皆即死其亦有不即死者病苦小腹裏急熱上衝胷頭重不能舉百節解離經脉緩弱血氣虚骨髓枯竭便噓噓吸吸氣力轉少著牀不能動搖起止仰人或引歲月方死出第八卷中

深師療婦人得温病雖差平復未滿一百日不可與交合交合

爲陰易之病病必拘急手足拳皆死丈夫病以易婦人名爲陽易速當療之可差滿四日不可療也宜令服此藥方

乾薑四兩

右一味擣末湯和一頓服温覆汗出得解止手足伸遂愈范汪同出第十四卷中

范汪豭音加雄鼠也下同鼠糞湯療傷寒病後男子陰易方

薤一大把　豭鼠糞十四枚

右二味以水五升煑取二升盡飲之温卧汗出便愈亦理勞復豭鼠屎兩頭尖者是也肘後薤作藍

又丹米湯療傷寒病已後男子陰易方

丹米

右一味末以薄酒和盡飲之温覆汗出便愈亦隨人大小不必三兩自以意消息之

又療交接勞復卵腫腹中絞痛便絕死竹皮湯方

刮青竹皮一升

右一味以水三升煮五六沸絞去滓頓服立愈肘後同

又療陰陽易栝樓湯方

栝樓根二兩

右一味以水五升煮取一升分二服先以青淡竹瀝一升合水二升煮好銀二兩減半去銀先與病人飲之訖須臾乃服湯小便利即差栝樓湯銀汁須冷服與前療湯方同

千金曰昔者有人得傷寒病已差未健詣華旉視脉旉曰雖差尚虛未復陽氣不足勿爲勞事餘勞尚可御内即死臨死當吐舌數寸其妻聞其夫病除從百餘里來省之止宿交接中間三日發病口舌出數寸而死病新差未滿百日氣力未平復而以房室者略無不死有士蓋王者病愈後六十日已能行射獵以

房室則吐涎而死及熱病房室名爲陰陽易之病皆難療多死近者有士大夫小得傷寒差以十餘日能乘馬行來謂平復以房室則小腹急痛手足拘拳而死醫者張苗說有婢得病後數十日有六人姧之皆死婦人得病易丈夫丈夫得病亦易婦人療之燒裩散方兼主温病陰易也

取女人中裩近隱處燒取灰

右一物爲散服方寸匕日三小便即利陰頭微腫此爲愈矣女人病可取男子裩如前法酒水服此本仲景方肘後同

又療交接勞復卵腫縮腹中絞痛便欲死者方

取交接婦人衣服以覆男子肘後同

又方

取女人手足爪二十枚　女人中衣裳一尺燒

右二味末以酒服亦米汁飲服之出第十卷中肘後同

傷寒勞復食復方二十五首

病源傷寒病新差津液未復血氣尚虛若勞動早更復成病故云復也若言語思慮則勞神梳頭澡洗則勞力勞則生熱熱氣乘虛還入經絡故復病也其脉沉緊者宜下之又食復傷寒病新差及大病之後脾胃尚虛穀氣未復若食豬肉腸血肥魚及久膩物必大下利醫所不能治也必至於死若食餅餌粢黍飴脯炙膾棗栗諸果牢強難消之物胃氣虛弱不能消化必更結熱適以藥下之則胃氣虛冷大利難禁不下之必死下之亦危皆難救也大病之後多坐此死不可不慎護也夫病新差後但得食糜粥寧可少食令飢慎勿飽不得他有所食雖思之勿與引日轉久可漸食羊肉糜若羹汁慎不可食豬狗等肉並出第八卷中

廣濟療傷寒因食勞復頭痛壯熱梔子湯方

梔子十四枚擘　香豉一升綿裹　葱白一握切　粟米三合

雄鼠屎（兩頭尖者二七枚燒令煙絕末）

右五味以水八升煑取二升三合去滓内鼠屎分三服服別相去如人行六七里須利内芒消五分忌麪炙肉蒜等物出第一卷中

深師療勞復大青湯方

大青（四兩） 甘草（二兩炙） 阿膠（二兩炙） 香豉（二兩）

右四味切以水一斗煑取三升去滓温服一升日五六欲盡復作常使有湯渴便飲無毒除熱止吐下傷寒一二日上至十數日困篤發汗熱不解吐下後熱不除止下痢甚良先煑大青甘草取四升去滓内膠豉膠消盡便漉去勿令豉壞當預漬膠令釋也忌菘菜海藻集驗肘後千金同

又方

取雞子空殼碎之熬令黃黑擣篩熱湯和一合服之

温臥取汗愈雞子殼悉服之肘後崔氏同

又方

取馬糞燒擣爲散冷酒服方寸匕良三炊頃便驗神良

又療傷寒差後勞復葵子湯方

葵子二升 粱米一升

右二味合煑作薄粥飲之多多爲佳取汗立差並出第十四卷中

范汪療傷寒病差語言書疏坐起行步勞復方

創青竹皮多多煑之令厚濃服三升汁則愈

又傷寒已愈食飲多勞復大黃豉湯方

豉五合 甘草二兩炙 桂心二兩 大黃四兩

芒消半斤

右五味㕮咀以水六升煑得二升去滓先食適寒温飲一升

日再忌海藻菘菜生葱等物

又療傷寒差巳後飲食勞復梔子湯方

梔子十四枚 豉一升 桂心二兩 麻黄二兩

大黄二兩

右五味㕮咀以水七升先煮麻黄掠去沫内餘藥更煮取二升去滓温服一升日再服當小汗及下利忌生葱並出第三十四卷中

千金療傷寒温病後勞復或食飲或動作梔子石膏湯方

梔子人三七枚擘 石膏五兩碎 鼠屎尖頭者二十枚 香豉一升綿裹

右四味以水七升煮取三升分三服

又療勞復或因洗手足或梳頭或食等勞復方

取洗手足汁飲之一合即愈

又方

取頭垢如棗核大吞一枚

又方

取飯燒爲末飲進一升肘後同

又療大病巳差勞復者枳實梔子湯方

枳實三枚炙 梔子十四枚擘

右二味以酢漿一斗先煎取六升煑藥取三升内豉一升煎五六沸去滓分再服覆取汗如有宿食者内大黄如碁子一枚范汪救急集驗並同出第十卷中張仲景傷寒論内大黄如博碁子五六枚

又療勞復垂死者方

煖湯三合洗四五歲女子陰取汁内口中服則愈男兒亦得起死人方

又療食勞方

麴一餅煑取汁服之

又療食勞方

杏人五十枚酢二升煎取一升服之取汗則差

又方

燒人糞灰水服之方寸匕

又療傷寒差後更頭痛壯熱煩悶者方

服黃龍湯三合日三服

又欲令病人不復者方

燒頭垢如梧子大服之並出第十卷中

崔氏療傷寒勞復鼠矢湯方

梔子二七枚擘 豉五合 鼠屎兩頭尖者二七枚

右三味以漿水二升煑取一升去滓頓服數試異驗出第一卷中

古今錄驗梔子湯療傷寒勞復方

梔子十四枚擘 麻黃二兩去節 大黃二兩 豉一升綿裹

右四味切以水七升煑取二升分爲三服深師肘後同

又療傷寒勞復鼠屎湯方

鼠屎二十一枚 豉一升綿裹 梔子七枚擘 大黃三兩切

右四味以水五升煎取二升七合分三服微取汗應小鴨溏下千金同

又療病新差早起及食多勞復鼠矢豉湯方

鼠屎兩頭尖者二十一枚 香豉一升

右二味以水三升煑取一升盡服之溫臥令小汗千金同

又療食不消勞復脉實者鼠矢梔子豉湯方

豉二升綿裹 鼠屎二十一枚 梔子七枚擘 麻黃三兩去節

右四味以水五升煑取二升分服七合汗微出日三服千金麻黃作大黃

又療傷寒已愈食飲多復發者方

豉五合綿裹 甘草二兩炙 大黃四兩 芒消半兩

右四味切以水九升煮取三升去滓飲一升日再范汪同忌菘菜海藻等

又療傷寒差令不復白芷散方

白芷十二分　白朮十分　防風八分　栝樓五分

桔梗四分　細辛三分　附子二分炮去皮　乾薑二分

桂心二分

右九味擣篩爲散以粳米粥清服一錢匕食已服二錢小兒服一錢常以雞子作羹臾粳米飯多少與病人食之亦未必常雞子羹粳米飯如服藥訖即扶起令行步仍擳頭洗手面食輒服之勞行如前則不復浩云數用佳范汪同忌豬肉桃李雀肉胡荽蒜青魚鮓生葱生菜出第三卷中一方有人參三分

傷寒百合病方七首

病源傷寒百合病者謂無經絡百脉一宗悉致病也皆因傷寒

虛勞大病之後不平復變成斯病也其狀意欲食復不能食常默默欲得臥復不得臥欲出行而復不能行飲食或有美時或有不用時聞飲食臭或如強健人而欲臥復不得眠如有寒復如無寒如有熱復如無熱至朝口苦小便赤黃百合之病諸藥不能療得藥則劇而吐利如有神靈所加也身形如和其人脉微數每尿輒頭痛其病六十日乃愈若尿時頭不痛淅淅然如寒者四十日愈若尿時快然但眩者二十日愈其證或未病而預見或病四五日而出或病二十日一月日復見其狀惡寒而嘔者病在上膲也二十三日當愈其狀腹滿微喘大便硬三四日一大便時復小溏者病在中膲也六十三日當愈其狀小便淋瀝難者病在下焦也四十三日當愈各隨其證以療之耳出第八卷中

仲景傷寒論療百合之病諸藥不能療若得藥則劇而吐痢如

有神靈所加也身體仍和脉微數每尿時輒頭痛六十日乃愈
尿頭不痛淅淅然者四十日愈尿快然但頭眩者二十日愈其證
或未病而預見或病四五日而出或病二十日一月日復見者悉
療之
又發汗已更發者百合知母湯主之方
百合七枚擘 知母三兩
右二味以泉水洗先漬百合經一宿上當白沫寫却其汁更
以好泉水二升煑取一升去滓置之一處別以泉水二升煑
知母取一升去滓二味汁相和煑取一升半分溫再服之小
品千金同
又下之已更發者百合滑石代赭湯主之方
百合七枚擘以泉水漬一宿上當白沫出去之 滑石三兩碎 代赭如彈丸一枚碎
右三味先以泉水二升煑百合取一升去滓置一㕔又以泉水二

升煑和二味取一升去滓合煎取一升半分再服千金小品同

又吐之巳更發者百合雞子湯主之方

百合七枚

右一味依前法泉水二升煑取一升去滓扣雞子一枚取中黃內百合湯中攪令調温再服之千金同

又不吐不下不發汗病形如初百合生地黃湯主之方

百合七枚

右一味依前法漬以泉水二升煑取一升生地黃汁一升二味汁相和煑取一升半温分再服一服中病者更勿服也大便當出惡沫千金小品並同

又百合病一月不解變成渴者

以漬百合水洗身法其後千金方中一味是後服栝樓牡蠣散其次則是並出第十七卷中

小品凡百合病見於陰而以陽法攻之其陰不得解也復發其汗此爲逆其病難治見於陽而以陰法攻之其陽不得解也復下之其病不愈千金百合病經一月不解變成渴者方

百合根一升切

右一味以水一斗漬之一宿以汁洗病人身也洗身訖食白湯餅今䭾飥也勿與鹽豉也渴不差可用栝樓根并牡蠣等分爲散飲服方寸匕日三服小品張仲景方同

又療百合病變而發熱者方

滑石三兩 百合根一兩炙

右二味末飲下方寸匕日三微利者止勿服之熱即除一本云治百合病小便赤澀臍下堅急

又百合病變腹中滿痛者方

但取百合根隨多少熬令色黃末飲服之方寸匕日

三滿消痛止小品同並出第十卷中

傷寒狐惑病方四首

仲景傷寒論狐惑之病其氣如傷寒嘿嘿但欲卧目瞑不得眠起則不安蝕於喉咽者為惑蝕於陰者為狐狐惑之病並惡飲食不欲聞飲食臭其面乍赤乍黒乍白蝕於上部其聲嗄蝕於下部其咽乾蝕於上部瀉心湯主之蝕於下部苦參湯淹洗之蝕於肛外者雄黄熏之

又瀉心湯兼下利不止心中愊愊堅而嘔腸中鳴者方

半夏半升洗 黄芩三兩 人參三兩 乾薑三兩

黄連一兩 甘草四兩炙 大棗十二枚擘

右七味切以水一斗煮取六升分服一升日三服忌豬肉冷水菘菜海藻羊肉餳千金同出第六卷中

又雄黄熏法兼主䘌病

雄黃一物研末以兩筒瓦合之火以熏下部

千金療狐惑薰草黃連湯方

黃連四兩去皮　薰草四兩

右二味切以白漿一斗漬之一宿煑取二升去滓分爲二服

小品同忌猪肉冷水

又其人脉數無熱微煩嘿嘿但欲卧汗出得之三四日眼赤如鳩眼者得之七八日其四眥黃黑能食者膿已成也療之方

以赤小豆三升漬之令生芽足復乾之加當歸三

末漿水服方寸匕日三小品同出第十卷中此大暴

凡病形不可灸因火爲邪散走血脉傷脉尚可傷藏則劇井輸穴腫黃汁自出經絡外爛肉腐爲癰膿此爲火疽七居反醫所傷也

凡微數之脉愼不可灸因火爲邪即致煩逆追虛逐實血散脉中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也

曾在東山劉惺常處